

過去の「みどころ」はHPの2ページ目以降にあります



ソシンロウバイの花  
(ロウバイ科)

花の無い時期に良いにおいのする黄色い花は貴重です。

ソシンロウバイの実  
(ロウバイ科)

昨年できた実で中に種が入っており、「偽果」と呼ばれます。

ソヨゴの実が見られます

スイセンが咲いています

サンシュユやウメの花芽が見られます

アセビの花芽が見られます

ドウダンツツジの  
頂芽が見られます

八幡谷

ピクニック  
広場

正門

森の文化館

森の  
バーベキュー-広場

ウッディ  
広場

森の  
クラフト館

茶室

森の  
研修館

奥池  
(水源池)

中池

下池

二俣の  
大コナラ

ソシンロウバイの  
去年の実が見られます

ソシンロウバイの花が  
咲きかけています

ソヨゴの実が見られます

コブシの花芽が見られます

ソヨゴの実が見られます

トチノキの頂芽が見られます

ホオノキの頂芽が見られます

ソヨゴの実が見られます

ソシンロウバイが  
咲いています



アセビの花芽 (ツツジ科)

アセビも咲く準備万端です。



ソヨゴの実 (モチノキ科)

野鳥に食べられずに残っているソヨゴに実がありました。



ドウダンツツジの頂芽  
(ツツジ科)

赤い色の頂芽が良く目立ちます。



スイセン (ヒガンバナ科)

冬を代表する花です。ガーデニングクラブが植栽してくださいました。




コブシの花芽 (モクレン科)

花芽は、軟毛に覆われています。



ホオノキの頂芽 (モクレン科)

頂芽は、キャップ状の芽鱗に包まれています。




トチノキの頂芽 (ムクロジ科)

頂芽は黒く良く目立ち、芽鱗は樹脂でべとべととしています。



バン (足の構造) (クイナ科)

水かきが無いバンの足の構造が良く分かります。



コガモ(雄) (カモ科)

上池、下池で見られる渡り鳥のカモで、雄は派手な色をしています。



コシガモ (カモ科)

中池で見られる渡り鳥のカモです。雄は日が当たる部分が鮮やかに見えます。



サンシュユの花芽 (ミズキ科)

丸い花芽が「早よ咲きたい！」と春を待っています。



ウメの花芽 (バラ科)

もうすぐ、ウメの花とメジロがセットに見られる季節になります。



カイツブリ (カイツブリ科)

奥池(三木市水源池)で見られる留鳥で、水に潜っている時間が長いです。



オオバン (クイナ科)

バンと違い、顔の前側が白色です。